

Kuracid® (ranitidin) tabletter 150 mg og 300 mg

Anvendelsesområde

Kuracid® nedsætter produktionen af mavesyre, og kan anvendes mod mavesmerter, der ledsages af sure opstød, svien eller halsbrand.

Dosering

Voksne 300 mg ved sengetid eller 150 mg 2 gange daglig i 4-8 uger.

Bivirkninger

Hypigheden af almindelige bivirkninger er mindre end 2%. Hovedpine, svimmelhed og milde gastrointestinale forstyrrelser er de hyppigste bivirkninger.

Særlige advarsler

Anvendes med forsigtighed til ældre samt personer med nedsat nyre- og/eller leverfunktion. Læs i øvrigt brugervejledningen i pakningen omhyggeligt.

Graviditet og amning

Graviditet: Erfaringsgrundlaget for anvendelse af Kuracid® til gravide er ringe – spørg lægen til råds.

Amning: Det virksomme stof, ranitidin, udskilles i modermælk i mængder, der medfører risiko for påvirkning af barnet selv ved terapeutiske doser. Ranitidin bør ikke anvendes i ammeperioden.

Udlevering

Kuracid® kan købes på apoteket uden recept.

Priser

Aktuelle priser kan findes på www.medicinpriser.dk eller spørg efter de dagsaktuelle priser på apoteket. Januar 2007.

Prøv Kuracid®

- nedsætter produktionen af mavesyre
- mod mavesmerter med halsbrand, svien og sure opstød
- virker i 12 timer (150 mg)
- synkes hele



Kuracid® fås i to varianter:

Med 150 mg ranitidin og med 300 mg ranitidin.
Få råd om dosering på apoteket eller hos din læge.

Sandoz A/S

C.F. Tietgens Boulevard 40 · 5220 Odense SØ
Telefon 63 95 10 00 · www.sandoz.dk

relevans 8582



For meget mavesyre?
Ta' en kur ... Kuracid®

 **SANDOZ**
A healthy decision

Halsbrand, sure opstød og svien i mellemgulvet

Hvis du jævnligt har en svien i maven, som ledsages af sure opstød eller halsbrand, kan det skyldes en irritation af mave-tarmkanalens slimhinde. Denne irritation opstår, når der ikke er balance mellem den beskyttende slimhinde og den stærke mavesyre. Er symptomerne konstante, kan der være tale om mavesår.



Kuracid® virker ved at nedsætte produktionen af mavesyre

De fleste præparater mod halsbrand virker ved at neutralisere mavesyren her og nu. Kuracid® virker ved at nedsætte selve produktionen af mavesyre, og kommer derfor ubehaget og den dårlige nattesøvn i forkøbet.

Ta' en kur i 4 uger

Kuracid® er let at bruge. Du skal bare tage 1 tablet (300 mg) ved sengetid eller 1 tablet (150 mg) morgen og aften. Se doseringsvejledningen! Hvis symptomerne ikke er væk efter en 4 ugers kur, bør du kontakte din læge.

Tips og gode råd

Ved at ændre lidt på dine vaner kan du selv forebygge problemer med halsbrand:

Stress Psykiske belastninger af enhver art øger produktionen af mavesyre. Lær at blive mere afslappet og sørg for rigelig og regelmæssig søvn.

Mad og drikke Spis flere små måltider i stedet for få store. Undgå at spise lige inden sengetid. Undgå fed og stærkt krydret mad, rå løg, frugtjuice, chokolade, pebermynte, cola, kaffe, vin og spiritus.



Overvægt Ved kraftig overvægt opstår der et øget tryk i maven, som kan presse maveindholdet op. Undgå også stramtsiddende tøj.

Undgå rygning Rygning øger produktionen af mavesyre.

Sov med hævet hovedgærde Hvis du har symptomer om natten, så læg en pude under madrassen eller klods sengen op med bøger eller mursten ved hovedgærdet.