

INDLÆGSSEDDEL

Kuracid 150 mg og 300 mg, filmovertrukne tabletter

Læs denne information godt igennem, før du begynder at bruge medicinen

- Du kan få denne medicin uden recept. For at opnå den bedste virkning, skal du altid følge vejledningerne i denne information.
- Gem informationen. Du får måske brug for at læse den igen.
- Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek.

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Kuracid virker ved at nedsætte dannelsen af mavesyre.

Kuracid anvendes til behandling af:

- Mavesår.
- Sår på tolvfingertarmen.
- Sår, forårsaget af bakterien *Helicobacter pylori* og som behandles med antibiotika.
- Sure opstød, svien, halsbrand eller betændelse i den nederste del af spiserøret, som skyldes tilbageløb af mavesyre til spiserøret.
- Kronisk dannelse af store mængder mavesyre, på grund af celleforandringer i maveslimhinden (Zollinger-Ellisons syndrom).

Derudover kan Kuracid anvendes ved:

- Forebyggelse af lungebetændelse i forbindelse med bedøvelse.
- Forebyggelse af stressbetonede skader (f.eks. akut blødende mavesår) opstået, hos alvorlige akutte syge.

Dette vil typisk være i forbindelse med et hospitalsophold.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. VIGTIG INFORMATION, SOM DU SKAL LÆSE, FØR DU TAGER KURACID

Tag ikke Kuracid, hvis:

- Du er overfølsom over for ranitidin eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Kuracid.

Særlige forholdsregler

- Hvis du er ældre og/eller har nedsat nyre- eller leverfunktion, bør du kun bruge Kuracid efter aftale med lægen.
- Hvis du har stofskiftesygdommen porfyri, må du kun bruge Kuracid efter aftale med lægen.
- Du må kun bruge Kuracid mod mavesår efter aftale med lægen.
- Hvis du er ældre, har en kronisk lungesygdom, har diabetes eller har nedsat immunforsvar kan risikoen for lungebetændelse være øget ved behandling med Kuracid. En undersøgelse har vist at brugere af Kuracid og lignende lægemidler har en øget risiko for lungebetændelse.

Brug af anden medicin

Nogle lægemidler kan påvirke eller påvirkes af Kuracid.

Du skal tale med din læge, hvis du er i behandling med:

- Svampemidler (ketoconazol). Du bør undgå denne kombination.
- Hjertemedicin (procainamid og N-acetylprocainamid).
- Astmamedicin (theofyllin).
- Tabletter mod diabetes (glipizid).
- Syreneutraliserende medicin og sucralfat (mod f.eks. mavesår). Du bør tage Kuracid ca. 2 timer før syreneutraliserende medicin eller sucralfat.

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Brug af Kuracid sammen med mad og drikkevarer

Du kan tage Kuracid sammen med mad og drikke.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet:

Du må kun bruge Kuracid efter lægens anvisning.

Amning:

Kuracid bliver udskilt i modermælken. Hvis du ammer, bør du ikke tage Kuracid. Spørg lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kuracid kan hos enkelte give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Kuracid

Kuracid indeholder lactose. Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE KURACID

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Kuracid kan tages med eller uden mad. Drik et glas vand sammen med medicinen.

Voksne:

Sår på tolvfingertarmen samt godartet mavesår:

2 tabletter på 150 mg (= 300 mg) eller 1 tablet på 300 mg ved sengetid.

En anden dosering kan være 1 tablet på 150 mg 2 gange daglig. Tabletterne tages morgen og aften.

Behandlingens varighed er normalt 4 uger, men hvis såret ikke er helet, bør behandlingen fortsætte yderligere 4 uger.

Ved sår på tolvfingertarmen kan dosis øges til 300 mg 2 gange daglig i 4 uger.

Forebyggende behandling af sår på tolvfingertarmen, samt godartet mavesår:

150 mg-300 mg, svarende til: 1 tablet på 150 mg eller 2 tabletter på 150 mg (= 300 mg) eller 1 tablet på 300 mg ved sengetid.

Gastroesofageal reflukssygdom

Symptomer som sure opstød, svien, halsbrand, og betændelsestilstande i den nederste del af spiserøret, som skyldes tilbageløb af mavesyre til spiserøret (spiserørskatar):

Dosis kan ved behov øges til 1 tablet på 150 mg 4 gange daglig, i op til 12 uger.

Forebyggende behandling af sure opstød, svien, halsbrand, og betændelsestilstande i den nederste del af spiserøret, som skyldes tilbageløb af mavesyre til spiserøret (spiserørskatar):

1 tablet på 150 mg 2 gange daglig.

Sår, forårsaget af bakterien *Helicobacter pylori* og som behandles med antibiotika.

1 tablet på 150 mg 2 gange daglig. Tabletterne tages morgen og aften.

En anden dosering kan være: 2 tabletter på 150 mg (= 300 mg) eller 1 tablet på 300 mg ved sengetid. Behandlingen bør fortsætte 2 uger efter antibiotikabehandlingen er stoppet.

Zollinger-Ellisons syndrom:

1 tablet på 150 mg 3 gange daglig. Dosis kan ved behov øges til i alt 6 gram daglig (20 Kuracid tabletter á 300 mg).

Forebyggelse af mavesår, som kan opstå ved stressbetonede skader (f.eks. svære kvæstelser, forbrændinger og infektioner), hos alvorligt akutte syge:

Når fødeindtagelse kan påbegyndes, kan behandling med indsprøjtning erstattes af 1 tablet på 150 mg 2 gange daglig.

Forebyggelse af lungebetændelse i forbindelse med bedøvelse:

1 tablet på 150 mg aftenen før operation og 1 tablet på 150 mg 2 timer før operation.

Ældre:

Du skal måske have en mindre dosis. Tal med din læge.

Børn:

Begrænset erfaring med behandling af børn.

Behandling af sår i mave og tarm: 2-4 mg/kg 2 gange daglig. Den maksimale døgndosis er 300 mg. Kuracid bør kun anvendes til korttidsbehandling.

Nedsat nyre- og leverfunktion:

Du skal måske have en mindre dosis. Tal med din læge.

Har du taget for mange Kuracid?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Kuracid, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Har du glemt at tage Kuracid?

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det. Hvis det er nået at blive tid til din næste dosis, skal du ikke tage dobbelt dosis, men blot følge din sædvanlige dosering.

4. BIVIRKNINGER

Kuracid kan, som al anden medicin give bivirkninger, selvom ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Ændringer i blodet (influenzalignende symptomer, høj feber, ondt i halsen, træthed, svimmelhed, bleghed, spontane blødninger). Hvis du får en af disse bivirkninger, så kontakt straks læge eller skadestue.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Overfølsomhedsreaktion med pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær, besvimelse, hævelse af tunge, læber og ansigt. Brystmerter. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Betændelse i bugspytkirtlen (voldsomme mavesmerter), akut nyrebetændelse (almen sløjhed, feber, evt. blod i urinen).

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Leverbetændelse og gulsot. Kronisk betændelse i de små pulsårer (feber, smerter, almen sløjhed). Hvis du får en af disse bivirkninger, så kontakt straks læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):
Hovedpine, svimmelhed, træthed, diarré og hududslæt.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):
Forbigående påvirkning af leverfunktionen.

Der kan i sjældne eller meget sjældne tilfælde optræde andre ikke alvorlige bivirkninger.
Ønsker du information om disse bivirkninger, så spørg lægen eller apoteket.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:
<http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>.

5. OPBEVARING

Opbevar Kuracid utilgængeligt for børn.
Tag ikke Kuracid efter den udløbsdato, der står på pakningen.

6. YDERLIGERE INFORMATION

Aflever altid eventuelle medicinrester på apoteket.

Kuracid 150 mg og 300 mg, filmovertrukne tabletter indeholder

Det aktive indholdsstof i Kuracid er ranitidin 150 mg eller 300 mg som ranitidinhydrochlorid. De øvrige indholdsstoffer er: Cellulose, mikrokrystallinsk; calciumhydrogenphosphat dihydrat; majsstivelse; natriumstivelsesglycolat (type A); magnesiumstearat; silica, vandfri kolloid; lactosemonohydrat; hypromellose; macrogol 4000; titandioxid (E171); gult jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende:

150 mg: gule, runde, og hvælvede filmovertrukne tabletter, med delekærv på den ene side.

300 mg: gule og aflange filmovertrukne tabletter, med delekærv på den ene side.

Pakningsstørrelser:

Kuracid 150 mg: 10, 20 og 60 filmovertrukne tabletter

Kuracid 300 mg: 10 og 30 filmovertrukne tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis blive markedsført.

Markedsføring i Danmark

Sandoz A/S, C. F. Tietgens Boulevard 40, DK-5220 Odense SØ, Danmark.

Fremstiller:

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, Barleben, Tyskland.

Senest revideret 28. marts 2007.